

Pech na accidentele verwijdering PEG-sonde

233

Denise Heppe, Davy Limpens en

Michiel van Wijk

Dr. D.H.M. Heppe, arts niet in opleiding tot specialist, afdeling Kinderneeskunde, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam

Drs. A.N.J.M. Limpens, kinderarts in opleiding, afdeling Kinderneeskunde, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. M.P. van Wijk, kinderarts-maagdarmleverziekten, afdeling Kinder-maagdarmleverziekten, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving.

Op pagina 260 en op www.praktischepediatrie.nl kunt u uw diagnose controleren.



Figuur 1

Buikoverzichtsfoto die werd gemaakt na inspuiten van contrastvloeistof (Telebrix Gastro).

Casus

Een 9-jarige jongen met metachromatische leukodystrofie (MLD), een percutane endoscopische gastrostomiesonde (PEG-sonde) en een baclofenpomp komt op de SEH omdat hij in een ongecontroleerde beweging zijn PEG-sonde (Entristar, 16 F) door het fistelkanaal naar buiten heeft getrokken. Vader heeft, na telefonische instructie, de sonde doorgeknipt en teruggeplaatst om de fistel open te houden. De jongen is door zijn ouders nuchter gehouden.

Wij zien op de SEH een niet zieke, alerte jongen die geen pijn lijkt te hebben. De sonde is in situ, geeft maagsap terug bij aspiratie en kan zonder moeite worden verwijderd. Het fistelkanaal ziet iets rood. Er is geen actief bloedverlies. Manipulatie lijkt niet pijnlijk.

Er wordt besloten een tijdelijke 16 F ballonkatheter (Kangaroo) te plaatsen. Deze kan zonder problemen worden opgevoerd. De ballon wordt gevuld met 10 ml water en teruggetrokken tot een weerstand voelbaar is. De katheter wordt zoals te doen gebruikelijk op de huid gefixeerd. Een proefvoeding loopt zonder problemen in. Vlak daarna lijkt de patiënt misselijk te worden en braakt hij eenmalig. Het braaksel bevat alleen slijm en maagsap, geen voeding. In de uren daarna blijft hij braken, zelfs na het stoppen van de voeding. Anti-emetica hebben geen effect.

Wat is uw diagnose?