

Een soepele zuigeling

234



Figuur 1

De schouders kunnen opvallend dicht naar elkaar toe worden gebracht.

Tijs Stehmann, Carlo Marcelis en

Carin Dassel

Drs. T.A. Stehmann, ANIOS Kinder-geneeskunde, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam

Dr. A.C.M. Dassel, kinderarts-neonato-loog, Deventer Ziekenhuis, Deventer

Drs. C.L.M. Marcelis, klinisch geneticus, Radboud umc, Nijmegen

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving.

Op pagina 256 en op www.praktishepediatrie.nl kunt u uw diagnose controleren.

Casus 1

Een mannelijke neonat bij wie antenataal echografisch een verminderde schedelbotdichtheid en polyhydramnion werden gezien, werd met een electieve sectio à terme geboren en had een matige start. Omdat er sprake was van aanhoudende tachypneu en subcostale intrekkingen, werd hij bij verdenking van transiënte tachypneu van de neonat voor respiratoire ondersteuning en evaluatie opgenomen op de neonatologieafdeling.

Bij volledig lichamelijk onderzoek viel op dat zowel de voorste als de achterste fontanel zeer groot was. Ook leek er sprake van hypertelorisme en waren de claviculae niet palpabel. Zijn schouders waren zeer mobiel en konden opvallend soepel dicht bij elkaar worden gebracht (figuur 1).

Wat is uw diagnose?