

Een pasgeborene met een schubbenhuid



Nina van Sprang en Titia Niers

Drs. N. van Sprang, anios
kindergeneeskunde, Maxima
Medisch Centrum, Veldhoven

Dr. L.E.M. Niers, kinderarts,
Maxima Medisch Centrum,
Veldhoven



Figuur 1

Huidbeeld bij de neonaat.

Casus

Een mannelijke neonaat werd geboren bij een termijn van 32+2 weken. Er was sprake van een normale graviditeit met een onverwachte premature partus. Het jongetje had een matige start met APGAR-scores van 5, 6 en 9 na één, vijf en tien minuten. Wegens een insufficiënte ademhaling werden tweemaal vijf insufflatiebeademingen gegeven en werd aansluitend enkele minuten beademd. Hierbij was geen extra zuurstoftoediening nodig. Na circa zes minuten was er sprake van een adequate eigen ademdrive. Tijdens de opvang viel het huidbeeld op zoals te zien is in figuur 1.

Het ging hier om het tweede kind van deze ouders. Het eerste kind was à terme geboren en was gezond. In de familie komen geen huidaandoeningen, auto-immuunaandoeningen of andere ziekten voor. De ouders zijn niet consanguin.

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving.

Op pagina 191 en op www.praktischediatrie.nl kunt u uw diagnose controleren.

Wat is uw diagnose?