

Een rectale prolaps bij een jong kind



40

Laurien Visser, Fabienne Ropers,

Lucia Kroft, Anne Loes van den

Boom en Luisa Mearin

G.L. Visser, MSc, aios kindergeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

F.G. Ropers, Dr. Med., kinderarts, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Dr. L. J.M. Kroft, radioloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Drs. A.L. van den Boom, aios kinderchirurgie (nu aios chirurgie), Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis

Dr. M.L. Mearin, kinderarts-mdl, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving.

Op pagina 60 en op www.praktishepediatrie.nl kunt u uw diagnose controleren.

Casus

Een 4 maanden oude jongen kwam naar de SEH in verband met een massa die sinds enkele uren recidiverend prolabeerde uit de anus. Patiënt was hierbij wisselend oncomfortabel. De ouders hadden ook helderrood bloed in de luier opgemerkt. Patiënt had al vier weken last van spugen en diarree, wat bleek te berusten op een enterovirusinfectie, gevolgd door bloederige diarree op basis van een campylobacterinfectie.

Bij algemeen onderzoek werd een niet acuut zieke jongen gezien met normale vitale parameters. Uit het rectum prolabeerde een donkerrood gekleurde massa van ongeveer vijf centimeter doorsnede. Patiënt was op dat moment comfortabel. De buik was soepel en er werd geen abdominale massa gevoeld. De zwelling kon gemakkelijk worden gereponeerd. Als werkdiagnose werd op dat moment gedacht aan een prolaps van rectumslijmvlies, zoals die vaker voorkomt bij kinderen. Patiënt werd opgenomen op de kinderafdeling in verband met dreigende dehydratie. Tijdens opname vertoonde de patiënt in de loop van enkele uren toenemende tekenen van ongemak. Voeding werd niet verdragen en in de luier werd meerdere malen helderrood bloed gezien. Bij herbeoordeling was patiënt bleek en klam, met koude acra. Op dat moment was er geen sprake van een prolaberende massa uit de anus. Bij onderzoek van de buik viel een vast aanvoelende zwelling in de linkeronderbuik op. Enkele minuten later prolabeerde de zwelling opnieuw uit de anus, waarbij opviel dat de abdominale zwelling niet meer palpabel was. De prolaberende massa was paars van kleur maar leek vitaal. De prolaps werd met enige moeite gereponeerd.

Wat is uw diagnose?