

Chronische luierdermatitis?

Ilse Luirink, Martine Raphael

Dr. I.K. Luirink, aios kindergeneeskunde, Amsterdam UMC

Dr. M.F. Raphael, kinderoncoloog, Amsterdam UMC

Casus

Een 14 maanden oud meisje werd opgenomen in verband met sinds een half jaar recidiverende koorts-episoden en een progressieve bilaterale lymfeklierzwellung in de hals en de liezen. De ouders vertelden dat hun kind vaak otitiden met effusie heeft gehad waarvoor ze recentelijk trommelvliesbuisjes heeft gekregen. Ook heeft ze al zolang zij zich kunnen herinneren een luierdermatitis die niet heeft gereageerd op veel verschillende topicale behandelingen.

Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een ziek, geagiteerd meisje met koorts en een niet wegdrubbare rood-paarse huiduitslag rond de slapen en in het luiergebied (figuur 1 en 2). Zij had een dubbelzijdige otitis met effusie en zeer forse, pijnlijke, vast aanvoelende klierpakketten zowel cervicaal als in de beide liezen (zie figuur 2). Er was geen organomegalie. Aanvullend laboratoriumonderzoek toonde een CRP van 73 mg/l, een anemie met een Hb van 3,5 mmol/l en normale leukocyten.



Figuur 1 Uitslag behaarde pariëtale hoofdhuid.



Figuur 2 Huiduitslag in het genitaal gebied met evidente lymfadenopathie in de liezen beiderzijds.

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving.

Op www.praktischediatrie.nl kunt u uw diagnose controleren.

Wat is uw diagnose?