

Een zwelling in de hals

Elodie Teesselink, Kim Zomer-Kooijker

Drs. E. Teesselink, ANIOS kindergeneeskunde, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Dr. K. Zomer-Kooijker, AIOS kindergeneeskunde, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Casus

Een 14-jarige jongen wordt door de huisarts verwezen vanwege een recidiverende, pijnlijke zwelling net onder de kaakhoek links. De klachten bestaan al enkele maanden en zijn op en af aanwezig. De pijn in de zwelling neemt toe na de maaltijd. Er is bij presentatie geen koorts; de patiënt heeft geen oor- of keelpijn en is niet ziek. De voorgeschiedenis is behoudens een doorgevoerde appendicitis acuta zonder bijzonderheden.

Onze patiënt is niet gevaccineerd.

Bij onderzoek wordt een niet-zieke jongen gezien, met links submandibulair een zacht-elastische, niet-pijnlijke zwelling van ongeveer 1-1,5 cm. Een echo van de zwelling laat een normaal beeld van de glandula parotis zien en een iets echo-armer aspect van de glandula submandibularis. Daarnaast wordt een andere duidelijke afwijking gezien. Hiervoor verricht de kno-arts een poliklinische ingreep.

Twee dagen na deze ingreep presenteert de patiënt zich opnieuw met koorts (39,2 °C). Eten en drinken lukt niet als gevolg van pijn en zwelling van hals en tong. Bij inspectie wordt een forse rood verkleurde submandibulaire zwelling gezien (figuur 1 en 2). Ook is er zwelling van de tong. Wat is uw diagnose, en welke complicatie ziet u hier?



Figuur 1 Zijaanzicht van zwelling.



Figuur 2 Vooraanzicht van zwelling.

In deze rubriek vragen wij u een diagnose te stellen aan de hand van een of meer foto's en een korte omschrijving.

Op www.praktischediatrie.nl kunt u uw diagnose controleren.